

Chlorocala africana subsuturalis

(Kraatz, 1891)

Afrikanischer Rosenkäfer



Chlorocala africana subsuturalis

Illustration: KI-generiert

24–28 °C

TEMPERATUR

60–80 %

LUFTFEUCHTE

19–24 mm

GRÖSSE

3–5 Monate

KÄFER

HERKUNFT

Tropisches Afrika, von der Elfenbeinküste bis Uganda und Tansania. Tagaktiv, liebt helles Licht.

EINRICHTUNG

Ab etwa 30 × 30 × 30 cm mit dichtem Deckel. Bodengrund 10 bis 15 cm hoch aus Laub, weißfaulem Holz und Flake Soil, erdfeucht. Raue Äste zum Abfliegen und Umdrehen.

FUTTER

Käfer: reifes Obst und Käfergelee, Obst täglich wechseln. Larven fressen den Bodengrund selbst.

ENTWICKLUNG

Rund ein Jahr: Larve vier bis sechs Monate, Puppe ein bis zwei Monate in einer festen Puppenwiege aus Erde.

WICHTIG

Puppenwiegen im Boden nie zerdrücken. Bodengrund weder austrocknen noch nass werden lassen. Rosenkäfer fliegen gut, Deckel immer schließen.

Schutzstatus: nicht geschützt

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/chlorocala-africana-subsuturalis.html

kunstspuren.com · @mario.vivarium

Stand September 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

