

Folsomia candida

Tropischer Springschwanz

Isotomidae



Illustration: KI-generiert

weiß

FARBE

bis 3 mm

GRÖSSE

18–22 °C

TEMPERATUR

feucht

UNTERGRUND

HERKUNFT

Weltweit im Boden, das Ursprungsgebiet ist unklar. Ohne Augenflecken, eher in tieferen Bodenschichten. Vermehrt sich ohne Männchen durch Jungfernzeugung.

EINRICHTUNG

Flache Kunststoffbox, feuchter Untergrund wie im Becken mit Holzkohle und Moos, nie austrocknen lassen, regelmäßig lüften. Labor: Gips mit Aktivkohle 8 zu 1.

FUTTER

Vor allem Pilzfäden. Im Labor trockene Bäckerhefe, zweimal pro Woche in kleinen Häufchen, alte Reste entfernen.

ZUCHT

Eier schlüpfen bei 21 °C nach etwa einer Woche, erwachsen nach etwa drei Wochen. Umsetzen mit Holzkohlestück oder feuchten Blättern.

WICHTIG

Bei mir die zweite Wahl nach dem rosa Springschwanz, der Schimmel und Reste wirksamer aufräumt. Zu viel Futter lässt den Untergrund schimmeln.

Schutzstatus: nicht geschützt

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/folsomia-candida.html

kunstspuren.com · @mario.vivarium

Stand Oktober 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

