

Neoholothele incei

(F. O. Pickard-Cambridge, 1899)

Trinidad-Zwergvogelspinne, mit Farbform „Gold“



Neoholothele incei

Illustration: KI-generiert

26–29 °C

TEMPERATUR

70–80 %

LUFTFEUCHTE

3–4 cm

KÖRPERLÄNGE

7–10 Jahre

WEIBCHEN

HERKUNFT

Trinidad und Tobago sowie Nordvenezuela. Bodenbewohner, gräbt und webt sehr viel.

NORMALE FORM UND „GOLD“

Die normale Form ist olivbraun, „Gold“ goldgelb bis karamellfarben und rezessiv vererbt. Beide Formen werden gleich gepflegt.

EINRICHTUNG

Etwa 20 × 20 × 20 cm, nicht höher. 7 bis 10 cm grabfähiger Bodengrund, eine feuchte Ecke, Kork, Rinde und feine Äste als Halt.

FUTTER

Heimchen oder kleine Schaben. Erwachsene alle 7 bis 10 Tage, Jungtiere alle paar Tage. Futterreste schnell entfernen.

KLIMA

Tropisch feucht. Nie austrocknen lassen, aber keine Staunässe. Nachts etwas kühler.

WICHTIG

Keine Brennhaare, aber extrem schnell: nicht auf die Hand nehmen. Vor und nach der Häutung kein lebendes Futter im Becken lassen.

Schutzstatus: kein Schutzstatus

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/neoholothele-incei.html

kunstspuren.com · @mario.vivarium

Stand Oktober 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

