

Pamphobeteus cf. antinous

Steely Blue Leg Birdeater (Artbestimmung offen)




Illustration: KI-generiert

24 bis 27 °C

TEMPERATUR

65 bis 75 %

LUFTFEUCHTE

16 bis 23 cm

GRÖSSE

über 15 Jahre

LEBENSERWARTUNG

HERKUNFT

Peru und Bolivien, Regenwald, bodenbewohnend. Männchen mit metallisch blauen bis violetten Beinen, Weibchen schwarz bis schwarzbraun. Das „cf.“ heißt: der Art ähnlich, Bestimmung nicht gesichert.

HALTUNG

Großzügige Grundfläche, nicht hoch, denn die Gattung klettert schlecht und stürzt leicht. Bodengrund 13 cm oder mehr, halb trocken, halb feucht. Große, gut erreichbare Wasserschale.

FUTTER

Grillen, Heuschrecken, Schaben. Jungtiere zwei- bis viermal pro Woche, halbwüchsige wöchentlich, erwachsene je nach Hinterleib alle 1 bis 3 Wochen. Kräftiger Appetit.

VERHALTEN

Quellen uneinig: von defensiv und schnell bis erst drohend. Brennhaare der Typen I und III werden gezielt abgeschleudert. Wachstum widersprüchlich beschrieben, Männchen reifen früher als Weibchen.

WICHTIG

Nicht auf die Hand nehmen und nie in Eile arbeiten. Der Handelsname „mascara“ und ähnliche Namen sind keine gültigen Artnamen, auch bei cf. antinous bleibt die Herkunft zu klären.

Schutzstatus: nach meiner Recherche nicht geschützt, bitte bei WISIA gegenprüfen

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/pamphobeteus-antinous.html

kunstspuren.com · @mario.vivarium

Stand Oktober 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

