

Sansevieria cylindrica

Spargelgewächse



Illustration: KI-generiert

21–24 °C

TEMPERATUR

niedrig

LUFTFEUCHTE

hell

LICHT

bis 2 m

BLATTHÖHE

HERKUNFT UND NAME

Angola im südlichen Afrika. Botanisch heute *Dracaena angolensis*. Runde, steife, graugrüne Blätter mit dunklen Querbändern in einer Fächerrosette.

STANDORT

Hell bis sonnig, an Sonne langsam gewöhnen. Im Winter nicht unter 10 °C, besser über 15 °C. Trockene Luft ist kein Problem.

GIESSEN UND DÜNGEN

Lieber zu trocken als zu nass: erst gießen, wenn die oberste Schicht trocken ist, im Winter etwa alle vier Wochen. Düngen März bis Oktober schwach alle drei bis vier Wochen.

VERMEHREN

Wurzelballen teilen oder Blattstücke von 10 bis 15 cm antrocknen lassen und in feuchte Anzuchterde stecken. Umtopfen nur selten, im Frühjahr.

WICHTIG

Schwach giftig, die Angaben gelten für die Gattung (Saponine). Außer Reichweite von Haustieren halten.

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/sansevieria-cylindrica.html

kunstspuren.com · [@mario.vivarium](https://twitter.com/mario.vivarium)

Stand Oktober 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

